

Schiphol veroorzaakt verhoogde bloeddruk

HAARLEMMEERMEER - Schiphol heeft een negatieve invloed op de bloeddruk van omwonenden. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Volgens schattingen van het RIVM hebben zeshonderd tot zestienhonderd mensen rond de luchthaven een verhoogde bloeddruk (hypertensie) door vliegtuiggeluid. Dat is ongeveer 2 procent van alle mensen met een verhoogde bloeddruk in het gebied.

Het RIVM heeft meegedaan aan een grote Europese studie, waarin werd onderzocht of mensen van 45 tot 70 jaar die veel blootstaan aan vliegtuiggeluid vaker een hoge bloeddruk hebben dan mensen die weinig aan dit geluid bloot-

staan. In gebieden waar het geluidsniveau laag was, 30 decibel, had 54 procent van de mensen een verhoogde bloeddruk. Bij een niveau van 55 decibel was dit percentage gestegen tot 59 procent. Mensen die veel aan geluid van wegverkeer blootstaan lopen vergelijkbare risico's.

Overigens blijkt het risico op een verhoogde bloeddruk lager dan 30 jaar geleden bij eerder onderzoek werd ingeschat. Andere onderzoeken buiten die waar het RIVM aan heeft meegedaan bevestigen dit.